



Utah Poison Control Center
585 Komas Dr., Ste 200
Salt Lake City, UT 84108

Phương Thức Khẩn Cấp Khi **NGỘ ĐỘC**

Hít Phải Chất Độc:



Tức tốc đưa bệnh nhân ra chỗ thoáng khí (ngoài trời). Tránh thở hơi độc, mở rộng tất cả cửa chính và cửa sổ.

Chất Độc Bám Vào Da:



Cởi bỏ quần áo đã bị nhiễm độc, dội nước lên chỗ dính chất độc cho 15 phút.

Chất Độc Dính Vào Mắt:



Xối nước ấm (đừng nóng quá) vào mắt cho 15 phút. Bảo người bị nhiễm độc chớp mắt càng nhiều càng tốt trong khi xối nước. Không nên vạch mí mắt họ.

Uống Nhầm Chất Độc:



Thuốc uống: Đừng cho ăn hoặc uống đến khi nào được sự cố vấn của trung tâm ngừa ngộ độc hoặc của bác sĩ.

Hoá Chất Hoặc Sản Phẩm Hoá Chất Dùng Trong Nhà: Nếu người bệnh còn tỉnh và có thể nuốt được, hãy cho uống liền một ly nước lạnh từ 2 đến 8 ounces (khoảng 60 đến 240 mL).

Hãy trữ trong nhà ít nhất một chai Ipecac Syrup (thuốc ói mửa) cho mỗi trẻ em trong nhà. **Đừng vội sử dụng thuốc này đến khi nào được chỉ thị sử dụng bởi trung tâm ngừa ngộ độc hoặc của bác sĩ.**

Sau Khi Đã Áp Dụng Những Phương

Thức Khẩn Cấp Hãy **GỌI:**

Nếu bệnh nhân bất tỉnh, làm kinh giật hoặc khó thở, gọi ngay số **9-1-1**

Nếu không, gọi trung tâm ngừa ngộ độc:

Salt Lake Valley : **1-800-222-1222**

Ngoài vùng Salt Lake Valley **1-800-222-1222**

Trung Tâm Ngừa Ngộ Độc của Utah cần thông dịch viên cho người bệnh nếu không nói được tiếng Anh. Khi gọi trung tâm ngừa ngộ độc, xin nói rõ ngôn ngữ đang sử dụng và giữ đường điện thoại liên lạc để chờ có thông dịch viên hữu dụng.